

proteja a su niño de la varicela



La varicela puede ser grave para niños y adultos. Antes que tuviéramos la vacuna, 11 000 personas eran hospitalizadas y cerca de 100 morían a causa de la varicela cada año en los Estados Unidos.

Acerca de la enfermedad La varicela usualmente causa fiebre y un brote en la piel de la cabeza a los pies con ampollas que dan picazón y que se pueden infectar y dejar cicatrices. La varicela también puede causar neumonía, encefalitis (hinchazón del recubrimiento del cerebro), infecciones de la piel y sangre e incluso la muerte.

La varicela se propaga fácilmente y puede pasarse de una persona a otra uno o dos días antes de que el brote en la piel aparezca. Se propaga por medio de la tos, los estornudos o por contacto directo con ampollas infectadas.

¿Cuándo se debe recibir la vacuna?

Se recomiendan **2 dosis** de la vacuna contra la varicela entre los **12 y 15 meses** de edad, y la segunda entre los **4 y 6 años** (antes de entrar al kínder).

¿Por qué debe mi niño obtener esta vacuna?

La varicela puede ser una enfermedad más leve, pero para algunas personas puede ser grave. No hay forma de predecir quién enfermará y sufrirá complicaciones. Las personas que tienen la enfermedad pueden contagiar a otras personas, quienes pueden estar en alto riesgo de enfermarse gravemente.



Llame hoy a su doctor, enfermera o clínica para recibir la vacuna contra la varicela.

¿Cuáles son los reglamentos escolares?

Para asistir a la guardería, al preescolar y el kínder, usted debe mostrar un



comprobante de vacunación contra la varicela o una declaración firmada por un médico de que su hijo ha tenido la enfermedad. Los niños con varicela deben de quedarse en casa sin ir a la escuela o guardería hasta que todas las ampollas hayan encostrado, lo que puede tardar más de una semana. A menudo, esto significa que los padres tampoco podrán ir al trabajo.

Después de la vacuna

Los efectos secundarios más comunes de la vacuna contra la varicela son por lo general leves, tienden a causar dolor y enrojecimiento donde se aplicó la vacuna y en ocasiones una fiebre ligera.

¿Puede mi niño ser vacunado y aún contagiarse de la varicela?

Algunos niños ya vacunados aún pueden llegar a contagiarse de la varicela debido a que ninguna vacuna es 100% efectiva.



Los niños vacunados son menos propensos a tener fiebre y tienden a recuperarse más rápidamente. Las personas que han sido vacunadas son menos propensas posteriormente a padecer de la culebrilla.

Aprenda más

Visite la página web del Departamento de Salud: www.doh.wa.gov/inmunizacion

Para encontrar una clínica de vacunación, llame a:

WithinReach

WithinReach Family Health Hotline
1-800-322-2588 (711 TTY relay)
or **www.ParentHelp123.org**

Washington State Department of
Health

PUBLIC HEALTH
ALWAYS WORKING FOR A SAFER AND
HEALTHIER WASHINGTON

Financiado parcialmente por el Programa Federal de Vacunas para Niños. Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-322-2588 o 711 (TTY relevador).

325-0158S DOH 348-110SP April 2015