



Позаботьтесь о пожизненной защите от гепатита В.

Вирус гепатита В является основной причиной рака в Соединенных Штатах и во всем мире. Вакцина против гепатита В предотвращает рак печени, вызываемый вирусом гепатита В.

Все младенцы нуждаются в защите, которую обеспечивают три дозы вакцины против гепатита В.

Начните защищать вашего ребенка с рождения – поставьте первую дозу вакцины против гепатита В



Безопасность вакцины

Вакцина против гепатита В безопасна и эффективна. Она применяется в США с 1982 года. Во всем мире было использовано более одного миллиарда доз вакцины против гепатита В.

Наиболее распространенные реакции на вакцины – болезненность в месте инъекции и повышение температуры – от легкой до умеренной. Эти побочные эффекты могут длиться 1-2 дня.

Дополнительные ресурсы

Centers for Disease Control and Prevention (Центры по контролю и профилактике заболеваний)

- 1-800-232-4636 (tty)1-888-232-6348
- www.cdc.gov/vaccines/default.htm (информация на веб-сайте на английском языке)

Immunization Action Coalition (Коалиция по проведению вакцинации)

- www.immunize.org/birthdose (информация на веб-сайте на английском языке)

Washington State Department of Health (Департамент здравоохранения штата Вашингтон)

- 1-866-397-0337
- <http://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/DiseasesandVaccines/HepatitisBDiseases> (информация на веб-сайте на английском языке)

WithinReach, The Family Health Hotline (Организация WithinReach, горячая линия по вопросам здоровья семьи)

- 1-800-322-2588
- www.withinreachwa.org (информация на веб-сайте на английском языке)

Public Health – Seattle & King County (Отдел общественного здравоохранения Сидэла и округа Кинг)

Perinatal Hepatitis B Prevention Program (Программа по перинатальной профилактике гепатита В)

- 206-296-4774
- www.kingcounty.gov/healthservices/health/languages/russian.aspx (информация на веб-сайте на английском языке)

Для получения информации о том, как сделать вашему ребенку вакцину против гепатита В, позвоните своему врачу, медсестре или в общественную поликлинику.



Другие форматы доступны по запросу.

DOH Pub 348-102 May 2015 Russian

Начните защищать вашего ребенка с рождения при помощи

вакцины против гепатита В



Первая вакцина, защищающая от рака печени

Почему моему ребенку нужна вакцина против гепатита В?

Младенцы меньше способны бороться с инфекцией гепатита В, чем дети старшего возраста и взрослые. При инфицировании младенца вероятность того, что у него или у нее разовьется хронический гепатит В, наиболее серьезная форма заболевания, составляет 90%.

Каждый четвертый ребенок с хроническим гепатитом В впоследствии умирает от заболеваний печени (включая рак печени).

Как я узнаю, что мой ребенок подвергается риску заражения гепатитом В?

Вы можете и не знать, что ваш ребенок подвергается риску заражения. Многие люди с вирусом гепатита В не знают, что у них он есть, потому что они не выглядят и не чувствуют себя больными. Но они могут передавать вирус другим.

Младенец или ребёнок младшего возраста может заразиться при контакте с инфицированным членом семьи, воспитателем или другим ребенком.

Мать, страдающая гепатитом В, может заразить своего новорожденного ребенка.

Проверка всех беременных женщин на гепатит В очень важна.



Что такое гепатит В?

Гепатит В вызывается вирусом, который поражает печень. Это может привести к тяжелой болезни, раку печени, а в некоторых случаях к смерти. Многие люди, заразившиеся гепатитом В, не выглядят и не чувствуют себя больными. У других может отмечаться потеря аппетита, боль в желудке, повышенная утомляемость или пожелтение кожи или глаз.

Как распространяется гепатит В?

Вирус гепатита В может передаваться:

- при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированного человека
- от инфицированной матери новорожденному ребенку во время родов
- при использовании нестерильных игл для инъекционных наркотиков, пирсинга или татуировок
- при использовании зараженных бритв, зубных щеток, мочалок и кусачек для ногтей
- при незащищенном сексе
- через укусы человека, соприкосновение раневых поверхностей
- при проживании с лицами, страдающими хроническим гепатитом В

Гепатит В НЕ передается через пищу и воду, поцелуи, пользование общей посудой, грудное вскармливание и кашель. Вирус не обнаруживается в поте, слезах и моче.

Вы и ваш ребенок подвергаетесь большему риску заражения гепатитом В, если вы, ваши родители или тот, с кем вы живете, родились в следующих регионах:

- Африка
- Аляска (сельская местность)
- Бассейн реки Амазонка
- Азия
- Восточная Европа
- Территория бывшего Советского Союза
- Ближний Восток
- Океания



Что я могу сделать, чтобы защитить своего ребенка?

Американская академия педиатрии (The American Academy of Pediatrics), Американская академия семейных врачей (American Academy of Family Physicians) и центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control & Prevention) рекомендуют введение первой дозы вакцины против гепатита В всем младенцам при рождении и введение двух дополнительных доз в последующие шесть месяцев.

1
Первая доза
при
рождении

2
Вторая доза
в
1-2 месяца

3
Третья доза
в
6 месяцев



Для обеспечения наилучшей защиты нужны все три дозы вакцины против гепатита В