Sífilis

"pox" o "sif"

La sífilis es una enfermedad muy grave. El contacto con las llagas de una persona infectada durante la relación sexual es la principal forma de transmisión de una persona a otra. También se puede transmitir de una mujer embarazada a su bebé.

Indicios y síntomas

La sífilis es una enfermedad complicada y grave y los síntomas varían durante las diferentes etapas de la enfermedad.

Primera etapa

Aproximadamente 3 semanas después de la relación sexual, aparece una única llaga indolora denominada chancro. Generalmente, aparece en el pene, el ano, el cuello uterino o la boca, pero puede aparecer en cualquier parte. El chancro puede parecer una llaga de otra enfermedad, incluyendo otras ETS. Con la sífilis sólo aparece una llaga. No duele y por lo general es dura en los bordes. La llaga es muy contagiosa, esto significa que puede transmitir sífilis a otras personas.

Segunda etapa

Si la sífilis no se trata durante la primera etapa, pasa a la segunda etapa. En 6 ó 7 semanas, las personas infectadas desarrollan un sarpullido en las palmas de las manos, plantas de los pies y otras partes del cuerpo. Este sarpullido es contagioso. Es probable que se sienta engripado. Estos síntomas desaparecen en 2 semanas aproximadamente, pero si no se tratan, su cerebro, corazón y otros órganos pueden comenzar a sufrir serios daños.

Tercera etapa o etapa latente

No hay síntomas y usted no contagia en la tercera etapa. El daño oculto empeora hasta el tratamiento o la muerte.

Examen

Se realiza un análisis de sangre para detectar los gérmenes en forma de espiral (espiroquete) que causan la sífilis. Las llagas también pueden ser examinadas. Si ha tenido relaciones sexuales con un persona con sífilis, debe ser examinado y tratado de inmediato. Es posible que los exámenes se realicen más de una vez.

Tratamiento

Se aplica una inyección de penicilina especial que elimina los gérmenes. Se puede aplicar en cualquier etapa y previene mayores daños. Puede volver a contraer sífilis si tiene relaciones sexuales con una persona infectada.

A las mujeres embarazadas se les realiza el examen de sífilis durante la atención prenatal. La madre y el bebé pueden ser tratados y curados durante el embarazo.

Prevención

- **Conozca a sus parejas**—vaya con ellas a las evaluaciones de las ETS.
- **Use preservativos correctamente cada vez que tenga relaciones sexuales.**
- **Tenga menos parejas.** Mientras más parejas tenga, mayor será su riesgo de contraer sífilis.
- **Las pastillas para el control de la natalidad no previenen la infección.**

Aprenda más acerca de la sífilis

Si tiene preguntas o necesita más información, póngase en contacto con su médico, departamento de salud local, clínica comunitaria o llame a la Línea Directa Nacional sobre ETS al **1-800-227-8922.**

Este documento se encuentra disponible en otros formatos para personas con discapacidades a solicitud del interesado. Para presentar una solicitud, llame al 1-800-525-0127 (TTY/TDD 1-800-833-6388).

Washington State Department of Health

DOH 347-025 July 2008 Spanish