

Los preadolescentes deben vacunarse



La vacuna del VPH previene el cáncer

Estimados padres o tutor:

Su hijo/a de 11 a 12 años necesita tres vacunas importantes, incluida la que puede prevenir el cáncer:

Una dosis de la vacuna Tdap para proteger contra tétanos, difteria y tos ferina.

Dos dosis de vacuna antimeningocócica para proteger contra cuatro tipos de meningococemia (meningitis). Los niños necesitan una dosis a los 11 años y una dosis de refuerzo a los 16 años (muchas universidades la requieren para el ingreso).

Tres dosis de la vacuna del virus del papiloma humano (VPH) para prevenir muchos tipos de cáncer. La vacuna del VPH es segura y eficaz en varones y mujeres, y la recomiendan los médicos y pediatras.

Anote las vacunas del VPH de su hijo/a:

Dosis 1 ___ / ___ Fecha de la cita ___ / ___

Dosis 2 Fecha de administración ___ / ___ Fecha de la cita ___ / ___

Dosis 3 Fecha de administración ___ / ___ Fecha de la cita ___ / ___

Obtenga información sobre otras vacunas para niños en www.doh.wa.gov/inmunizacion. Obtenga más información sobre el VPH en www.cdc.gov/vaccines/who/teens/vaccines/hpv-sp.html.

Washington State Department of Health
Office of Immunization and Child Profile
310 Israel Road SE, Olympia, WA 98501

¿Necesita un médico u otros recursos?

Llame a la línea directa de salud familiar al 1-800-322-2588
(para el servicio de TTY, llame al 711) o visite www.parenthelp123.org/es/.
